

**Салмонеллезы** — инфекционные заболевания, вызываемые салмонеллами, родоначальником которых является кишечная палочка. Салмонеллезы относятся к зооантропонозам и встречаются как у человека, так и у многих животных, от которых инфекция передается человеку пищевым путем.

Наибольшее значение в патологии человека принадлежит трем типам салмонелл: *S. typhi* murium, *S. enteritidis* (Gartueri) и *S. choleraesuis*.

**Патогенез** салмонеллезов в значительной мере определяется количеством эндотоксина, освобождающегося при распаде салмонелл в кишечнике, куда они попадают вместе с испорченными пищевыми продуктами, [зараженными бактериями](#). Обычно в клинику больные поступают с картиной пищевой токсикоинфекции. Эндотоксин вызывает картину острого гастроэнтерита, сосудистые расстройства и явления коллапса. По мнению некоторых исследователей, эндотоксин салмонелл оказывает патогенное действие на интерорецепторы желудочно-кишечного тракта и сосудов, что и вызывает рефлекторно все последующие изменения.

**Патологическая анатомия** салмонеллеза зависит от формы заболевания. Различают три формы салмонеллеза:

- 1) кишечную (токсическую);
  - 2) септическую;
  - 3) брюшнотифозную.
-

**Прочитать еще:**

1) [Специфическое воспаление](#)

2) [Ретикулярные клетки](#)

3) [Фагоцитоз](#)