

Кишечная палочка относится к условно патогенным микроорганизмам и входит в состав нормальной микрофлоры кишечника. Однако, попадая в другие органы (мочевыводящие пути, брюшную полость, желчные пути и т. д.), кишечная палочка может становиться патогенной для человека.

Кроме того, существуют штаммы кишечной палочки, обладающие **патогенными свойствами**

(энтеропатогенные кишечные палочки) и способные вызывать заболевания, носящие характер эпидемических вспышек. Определить эти патогенные штаммы кишечной палочки можно только на основании изучения их антигенной структуры.

Колибактериальная инфекция встречается как у взрослых, так и у детей, но особенно часто в раннем детском возрасте. У взрослых колибактериальная инфекция может носить местный и общий характер. Местные процессы возникают в желчных и моче выводящих путях в виде гнойного воспаления.

[Колибак](#)

[териальная инфекция](#)

влагалища, матки, придатков нередко развивается в послеродовом периоде. Общая колибактериальная инфекция может развиваться на почве какого-либо местного воспалительного очага (например, в мочевыводящих путях) и приобретает характер сепсиса. Что касается общих симптомов, то на первый план выступают расстройства стула, интоксикация и диспепсические нарушения. Выраженность их напрямую связана с тяжестью инфекции.

Прочитать еще:

- 1) [Этиология врожденных пороков](#)
- 2) [Распространенность пороков сердца](#)
- 3) [Влияние нервных факторов на воспаление](#)