Сепсис (от лат. sepsis — гниение) представляет собой вызываемое разнообразными возбудителями инфекционное заболевание, возникновение и развитие которого определяются в значительной степени реактивными свойствами организма.

Проникающие в кровоток бактерии при определенных условиях вызывают ответную реакцию и обусловливают ряд дистрофических и воспалительных изменений в органах.

От других инфекционных болезней сепсис отличается следующим:

1. Заболевание полиэтиологично. Сепсис могут вызывать стафилококки, стрептококки, пневмококки, менингококки, синегнойная палочка, туберкулезные микобактерии, брюшнотифозная палочка и многие другие микробы (до 30 видов).
2. Сепсис не является заразной болезнью в общепринятом смысле. В редких случаях он возникает у хирургов после случайного ранения при вскрытии гнойников у больных сепсисом, а также у патологоанатомов , поранившихся при вскрытии трупов умерших от сепсиса. Никаких других способов заражения (путем самого тесного контакта с больными, через кровососущих насекомых) для сепсиса не существует.
3. Клиническая картина сепсиса очень разнообразна, причем характерные изменения возникают обычно в месте входных ворот инфекции.
В некоторых случаях это место трудно обнаружить или оно отсутствует.
4. Сепсис не имеет определенных сроков течения. Неодинаковым может быть инкубационный период, продолжающийся от 2—3 часов до не скольких суток и даже недель. Продолжительность болезни от нескольких дней до нескольких месяцев.

Прочитать еще:

1) Осложнения дифтерии

2) Бешенство

3) Виды гранулем