

Общие изменения, наблюдающиеся при сепсисе, носят характер дистрофических, воспалительных и гиперпластических.

Дистрофические процессы возникают в паренхиматозных органах (печень, почки, миокард, мышцы, центральная нервная система) и проявляются различными изменениями, начиная от мутного набухания и кончая некрозами. **Воспалительные изменения** носят характер межуточных (интерстициальных) процессов, выражающихся межуточным отеком, лимфоидноклеточной и лейкоцитарной инфильтрацией — межуточный септический нефрит, гепатит, миокардит и т. д.

В клапанах сердца может возникать острый язвенный тромбоэндокардит с расправлением ткани клапанов и их отрывом. В стенке сосудов также возникают [воспалительные изменения](#)

(васкулиты). На почве изменений сосудов появляются

кровоизлияния

. Гиперпластические процессы при сепсисе наблюдаются главным образом в кроветворной и лимфоидной тканях. Так, желтый костный мозг трубчатых костей становится красным (усиление гемопоэза), в крови увеличивается число белых кровяных клеток, иногда даже с некоторым сдвигом формулы в сторону омоложения — появление в периферической крови незрелых форм, что обозначается как лейкомоидная реакция.

Прочитать еще:

- 1) [Физиологическое кроветворение](#)
- 2) [Пороки сердца](#)
- 3) [Перихолангиолитическая форма гепатита](#)