

Вторичным туберкулезом называют такие его проявления, которые возникают в организме, перенесшем первичную инфекцию, и обычно развиваются в легких на фоне относительного приобретенного иммунитета.

В связи с этим процесс при вторичном туберкулезе длительное время ограничивается только легкими; если же он медленно прогрессирует, то только по бронхам или по кишечной трубке при заглатывании инфицированной мокроты (интраканаликулярное распространение процесса). Очень редко вовлекаются в **специфическое воспаление** лимфатические или кровеносные, сосуды. В лимфатических узлах корня легкого развивается неспецифический

[воспалительный процесс](#)

. Очаги вторичного туберкулеза возникают обычно в I или II сегменте правого легкого и носят название очагов реинфекта или по имени впервые детально описавшего их в 1904 г. ученого обозначают очагами

Абрикосова

. Реинфектами их называют потому, что очаги возникают в легких как бы в результате новой, повторной инфекции, или реинфекции, у лиц, имеющих первичный очаг и комплекс. Ранние проявления вторичного туберкулеза, как показал А. И. Абрикосов, состоят в развитии специфического эндобронхита и панbronхита мелкого внутридолькового bronха верхушки (I и II сегменты) чаще правого и реже левого легкого.

Прочитать еще:

- 1) [Липоидный нефроз](#)
- 2) [Общие сведения об опухолях](#)
- 3) [Экзогенные гипо- и апластические анемии](#)