

Возвратный тиф (typhus recurrens) — острое инфекционное заболевание, течение которого характеризуется приступами («лихорадками») болезни. Обычно наблюдается 3—4 приступа.

Этиологию заболевания установил в 1873 г. Obermeier, обнаруживший в крови больных спирохету (трепонему). По современной классификации возбудитель носит название *Borrelia recurrentis*.

Патогенез возвратного тифа являлся предметом многочисленных исследований. Возвратный тиф передается от человека человеку через укусы вшей и других насекомых, у которых спирохеты размножаются в организме и гемолимфе, не выделяясь в окружающую среду. Заражение происходит только при расчесах, сопровождающихся раздавливанием вши. В [патогенезе](#) развития патологии существенную роль играют иммунные силы организма. Во время приступов лихорадки спирохеты беспрепятственно циркулируют в сосудистом русле, а далее снова пропадают. Имеются данные о том, что трепонемы, обнаруживаемые в крови при каждом приступе, отличаются по своим антигенным характеристикам от трепонем предыдущей лихорадки. Вопрос о значении клеточных и гуморальных механизмов в роли исчезновения из сосудов спирохет в межприступном промежутке до сих пор окончательно не доказан. Иммуитет после перенесенной болезни очень длительный и стабильный.

Прочитать еще:

- 1) [Отличие хронического панкреатита от ишемического](#)
- 2) [Расслаивающая аневризма брюшной аорты](#)
- 3) [Воспалительные процессы в половых органах](#)