

Пневмоцисты — шаровидные образования размером 5Х12, ограниченные снаружи тонкой оболочкой, дающей отчетливую PAS-реакцию. Под оболочкой находится тельце паразита, имеющее округлую форму и окрашивающееся ядерными красками.

Цисты с 4—8 ядрами характерны для стадии спорогонии.

Переполнение альвеол и бронхиол пневмоцистами ведет к кислородному голоданию организма, одышке. По ходу развития болезни в легких появляются макрофаги, происходит разрушение, рассасывание пневмоцист и восстановление структуры легкого. В редких случаях наблюдается карнификация и развивается [пневмосклероз](#) . Иногда отмечается сочетание пневмоцистоза с инклюзионной цито-мегалией (по некоторым данным, в 80% случаев). Идет ли здесь речь о случайном сочетании двух заболеваний или одно заболевание предрасполагает к возникновению другой, до сих пор остается неясным. Изменений вне легких при пневмоцистозе **не описано**.

Летальность при пневмоцистозе может достигать больших цифр (колебания от 10 до 60%). Смерть больных наступает от легочной недостаточности. В России пневмоцистозы наблюдаются в виде единичных случаев. Из стран Европы это заболевание чаще всего встречается в Чехии.

Прочитать еще:

- 1) [Экстрапирамидные расстройства](#)
- 2) [Атетоз](#)
- 3) [Редкие симптомы поражения мозжечка](#)