

Анатомо-физиологическая характеристика лобных долей с прецентрными извилинами устанавливает связь этих отделов мозга, прежде всего, с двигательными функциями.

Проекционная зона кинестетического (двигательного) анализатора, как указывалось, находится в теменной доле, в основном в постцентральной извилине, но часть проводников глубокой чувствительности заканчивается и в прецентральной извилине.

Таким образом, в этой области происходит перекрытие зон кинестетического и кожного анализаторов. Верхние слои клеток лобных долей включаются в работу кинестетического анализатора, они участвуют в формировании и регуляции сложных двигательных актов.

В лобных долях начинаются различные [эфферентные двигательные системы](#). В пятом слое прецентральной извилины находятся большие пирамидные клетки

Беца

— начало кортикоспинальных и кортиконуклеарных трактов. От обширных экстрапирамидных отделов лобных долей в премоторной зоне (главным образом от цитоархитектонических полей 6 и 8) и ее медиальной поверхности (поля 7, 19) идут многочисленные проводники к подкорковым и стволовым образованиям (фронтоталамические, фронтопараллельные, фронтонигральные, фронторубральные и др).

В лобных долях, в частности в их полюсах, начинаются **фронтотенторинтегументальные пути**, включенные в систему координации движений. Эти анатомо-физиологические данные объясняют, почему при поражениях лобных долей нарушаются главным образом двигательные функции, а в сфере высшей мозговой деятельности — моторика речи и поведенческие акты, связанные с осуществлением сложных двигательных функций.

Характеристика лобных долей

Written by Super Administrator

Tuesday, 21 December 2010 13:45 - Last Updated Wednesday, 15 August 2012 08:46

Прочитать еще:

1) [Причины Гиалиноза](#)

2) [Причины Гиалиноза](#)

3) [Порфирины и гематины](#)