

Редко диагностируют невралгию в участке расхождения чувствительных ветвей IX пары: в миндалинах, задней стенке глотки, в спинке языка и в глубине уха.

Сильная боль появляется приступами, длится от пары секунд до минут. Промежутки между приступами различные (от часов до недель). Поражается обычно один нерв (правый или левый). В составе языкоглоточного нерва кроме двигательных и чувствительных имеются и секреторные (вегетативные) волокна для **околоушной железы**. Тела относящихся к ним клеток расположены в нижнем слюноотделительном ядре, локализованном в нижнем отделе продолговатого мозга. Эти предузловые волокна в составе IX пары направляются к [околоушному ганглию](#), расположившегося под основанием черепа ниже овального отверстия. От него берут начало заузловые волокна, доходящие до околоушной слюнной железы.

В результате ее секреторные клетки получают импульсы как от вкусового ядра продолговатого мозга (врожденная дуга слюноотделительного рефлекса), так и от корковых отделов вкусового анализатора (дуга условных рефлексов).

При **патологии** слюноотделительных волокон языкоглоточного нерва **формируется** некоторая сухость слизистой во рту, однако часто пациенты этого не замечают. Другие слюнные железы компенсируют нехватку слюноотделения.

Прочитать еще:

- 1) [Аддисонова болезнь](#)
- 2) [Патологическая анатомия полиомиелита](#)
- 3) [Патологическая анатомия кори](#)